

## 研究簡報

### 上海初次發現白蛉的报告

A report on the Sandflies newly found in Shanghai

上海第一医学院寄生虫学教研组

Department of Parasitology, Shanghai First Medical College

白蛉在我国的分布是北方較多于南方。到目前为止, 國內已經有記載的种类共有 19 种, 包括变种。19 种中分布在江苏省的有 6 种: (1) 中华白蛉 *Phlebotomus chinensis*, (2) 蒙古白蛉 *Phlebotomus mongolensis*, (3) 江苏白蛉 *Phlebotomus kiangsuensis*, (4) 鲍氏白蛉 *Phlebotomus barraudi*, (5) 鳞喙白蛉 *Phlebotomus squamirostris*, (6) 南京白蛉 *Phlebotomus nankingensis*。这六种主要是分布在苏北地区——徐州, 海州, 淮陰, 淮安, 涟水, 揚州。苏南地区白蛉的分布只局限于南京市, 共有

四种, 即鲍氏白蛉, 鳞喙白蛉, 南京白蛉和中华白蛉。其他地区, 尚未有白蛉分布的記載。

1956年5月28日晚, 本教研组練習技术生在本市淮海中路住宅中电灯泡上获得小虫一只, 經教研组檢查后确定为白蛉。以后在6月中每隔二、三天去采集一次, 每次采得标本約2—8只。將标本制片, 經詳細鑒定, 肯定为鳞喙白蛉 *Phlebotomus squamirostris*。6月后即不易找到。

該虫在上海地区的分布情况和生活習性, 待将来再作詳細的报告。 (徐蔭祺)